

LDQ (Leeds Dependence Questionnaire)**Лидский опросник зависимости (ЛОЗ)**

| | Вопросы | Никогда | Иногда | Часто | Почти всегда |
|-----------|--|----------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1 | Вы ловите себя на мысли о том, когда в следующий раз Вы сможете принять обезболивающий препарат (анальгетик). | | | | |
| 2 | Прием анальгетиков является для Вас более важным, чем что-либо еще, что вы делаете в течение дня. | | | | |
| 3 | Вы чувствуете, что Ваша потребность принять обезболивающее слишком сильна, чтобы ее контролировать. | | | | |
| 4 | Вы планируете свой день с учетом приема анальгетиков. | | | | |
| 5 | Вы принимаете анальгетик каким-либо особым образом для того, чтобы усилить его эффект. | | | | |
| 6 | Вы принимаете анальгетик утром, днем и вечером. | | | | |
| 7 | Вы чувствуете, что должны продолжать принимать обезболивающие, раз уж Вы начали это делать. | | | | |
| 8 | Эффект от лечения более важен для вас, чем конкретный анальгетик, который вы принимаете. | | | | |
| 9 | Вы чувствуете, что захотите принимать большее количество обезболивающего препарата, когда его эффект начнет снижаться. | | | | |
| 10 | Вы считаете, что жить без обезболивающих трудно. | | | | |
| | Общий балл | | | | |

Средние значения для групп по данным A.Ferrari et al. 2005 (точная сноска в статье)

Группа пациентов с хронической ГБ – 11.6 баллов
Группа пациентов с эпизодической Гб – 5.6 баллов
Группа пациентов с другим абзусом – 10.3 баллов
(другие препараты)